




La Iridología y el Ojo de La Paloma

El círculo de adaptación “diferentes formas”

B - FRACCIONADO.

Aunque con un grosor mayor aproximadamente de 0,2 a 0,3 milímetros y del mismo color que el anterior (A) “Incompleto”, éste aparece fragmentado,



"B"


deformado o diluido en algunas de sus partes, siendo más fácil de apreciar. La paloma que tenga este círculo de adaptación, podría ser destinada como reproductora, dependiendo: de los “*signos o trazos*” que presente, de la conformación del iris, sus cualidades físicas, capacidad de orientación, tesón, así como de su linaje,

características todas ellas complementarias.

EJEMPLO - B. Fraccionado.

El mismo ojo real del caso anterior figura [P02], en el que podemos comparar las diferencias esenciales, presenta un círculo de adaptación que rodea en

casi su totalidad a la pupila, de color marrón con un grosor muy estimable; pero que aparece fraccionado, partido, cortado o disminuido en algunas de sus partes, (parte superior derecha) por lo cual ha perdido gran parte de su clase, siendo de



"B"

superior calidad que el anterior (A) “Incompleto”. La paloma que posea este tipo de círculo de calidad en sus ojos, podría ser destinada como reproductora; si es acompañada por un iris con sus tres zonas perfectamente delimitadas y un círculos de correlación con signos y trazos destacados, (trazos circulares y radiales).

J. M. Mateo